inO GREEN - K

OPTIMISE LA QUALITÉ DES RÉCOLTES

ENGRAIS CE - Solution NK (3-32)

COMPOSITION

N	46,7 g/L
K_2O	500 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Formulation	**Solution hautement concentrée en potassium**
Utilisation	**Foliaire**
Conditionnement	10 L (palette 600L)
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel
Conservation du produit	18 mois
Effet acidifiant sur la bouillie	pas d'effet
Forme	Liquide - (SL)
Densité	1,53

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

Rôles des éléments

Azote:
- Constituant essentiel des protéines
- Rôle enzymatique
- Photosynthèse

Potassium :
- Synthèse et transfert des sucres
- Deuxième facteur de rendement
- Photosynthèse
- Régulation de l'alimentation hydrique

Caractéristiques

inO GREEN - K est spécifiquement étudié et équilibré pour optimiser en fin de cycle la maturité et la qualité de la vendange et des fruits. Par une action foliaire, il aide au transfert des substances élaborées, des feuilles vers les fruits ou les baies.

inO GREEN - K est un concentré de potassium 100% soluble en association synergique avec l'Azote.

Intérêts de la formulation

La formulation spécifique de ce produit garantit une haute affinité avec le feuillage, sans risque de brûlure et étudiée pour une absorption des éléments nutritifs en moins de 6 heures par voie foliaire.

Ce produit est formulé à base de matières premières rigoureusement sélectionnées, garanties par notre contrôle qualité, pour assurer un parfaite sécurité d'emploi et pour optimiser l'absorption par les feuilles.

MODE D'EMPLOI

Principales cultures	Doses /ha	Concentration maximale d'utilisation	Périodes d'application
Vigne	3-4L	1%	2 à 4 applications espacées de 10 à 15 jours à partir du stade nouaison.
Arbres fruitiers			4 à 6 applications espacées de 15 jours, dès le grossissement des fruits et jusqu'à 2 semaines avant récolte.
Grandes cultures et Cultures légumières		0,5% sur feuillage jeune	3 à 5 applications sur feuillage suffisamment développé.

* Pour les cultures sous abri, procéder à un test préalable à la concentration de 0,3% pour observer le comportement de la végétation.

CONSEILS PRATIQUES

Préparation de la bouillie

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau / ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur l'ensemble du feuillage sans ruissellement. Préférer les traitements aux températures comprises entre 6 et 25 °C.
- Agiter le bidon pour homogénéisation.
- Verser progressivement le produit, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche.
- Rincer l'emballage deux fois.

En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit en dernier.

inO NUTRITION